

Aufgabe 1 (8 Punkte) Gegeben sind die Mengen

$$M_1 = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - i| \leq \operatorname{Im}(z + i) \right\} \quad \text{und} \quad M_2 = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid |z - i| = \frac{4}{|\bar{z} + i|} \right\}$$

in der komplexen Zahlenebene.

- (a) Skizzieren Sie M_1 und M_2 .
- (b) Lesen Sie aus Ihrer Skizze ab, welche der komplexen Zahlen, die in beiden Mengen liegen, den kleinsten Betrag haben (d.h. am nächsten an $z = 0$ liegen) und geben Sie diesen minimalen Betrag an.

- (a) Verwendet man die Darstellung $z = x + yi$ erhält man aus der linken und rechten Seite der Bedingung für M_1

$$|x + yi - i| = |x + (y - 1)i| = \sqrt{x^2 + y^2 - 2y + 1} \quad \text{bzw.} \quad \operatorname{Im}(x + yi + i) = y + 1.$$

Die Quadrate müssen daher die Beziehung

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 \leq y^2 + 2y + 1,$$


erfüllen, bzw. nach y aufgelöst ergibt sich $y \geq x^2/4$. Die Menge M_1 besteht also aus den komplexen Zahlen die zu einer gestauchten Parabel mit Scheitel $(0, 0)$ gehören oder darüber liegen.

(Da nur positive y -Werte auftreten, erfüllen diese Punkte auch die ursprüngliche Ungleichung.)

Für die Punkte $z = x + yi$, die zu M_2 gehören, gilt

$$\sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 4/\sqrt{x^2 + (1 - y)^2} \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 4.$$

Diese Gleichung beschreibt einen Kreis um i mit Radius 2.



- (b) Da der Mittelpunkt des Kreises auf der positiven imaginären Achse liegt, fällt der Abstand der Kreispunkte zum Ursprung monoton ab, wenn man von $3i$ nach $-i$ wandert. Die Punkte mit kleinstem Abstand zum Ursprung sind daher die Schnittpunkte mit der Parabel, also $\pm 2 + i$ mit dem Betrag $\sqrt{5}$.

Aufgabe 2 (4 Punkte) Gegeben sind die Vektoren

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und der Punkt $P = (2, -2, 1)$.

- (a) Zeigen Sie, dass die Vektoren f_1, f_2, f_3 paarweise orthogonal sind, aber kein Orthonormal-System bilden.
- (b) Sei E die Ebene senkrecht zu f_1 durch den Punkt P . Geben Sie die Hessesche Normalform der Ebene E an und bestimmen Sie den Abstand der Ebene vom Ursprung O .

(a) Test auf Orthogonalität:

$$\begin{aligned} \langle f_1 | f_2 \rangle &= 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0, & \langle f_1 | f_3 \rangle &= 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0, \\ \langle f_2 | f_3 \rangle &= 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

Nicht normiert:

$$|f_1|^2 = 1 + 1 + 4 = 6, \quad |f_2|^2 = 1 + 1 + 0 = 2, \quad |f_3|^2 = 1 + 1 + 1 = 3,$$

Es genügt natürlich nur bei einem Vektor festzustellen, dass er nicht normiert ist.

(b) $\langle f_1 | p \rangle = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = 6 \Rightarrow$

Beschreibung der Ebene in Hessescher Normalform: (auf positive rechte Seite achten)

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{6}} f_1 \mid x \right\rangle = \sqrt{6}$$

Abstand zum Ursprung: $\sqrt{6}$

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Gegeben ist das reelle lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = A_\alpha = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -6 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- (a) Für welche Werte des Parameters α ist das System eindeutig lösbar?
- (b) Geben Sie den Rang der Matrix A_α in Abhängigkeit von α an.
- (c) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems für $\alpha = -3$.
- (d) Gibt es einen Parameterwert α , für den in einer Lösung des Gleichungssystems alle Variablen den gleichen Wert (d.h. $x_1 = x_2 = x_3$) annehmen?

Wir betrachten die erweiterte Matrix

$$[A_\alpha | b] = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -6 & \alpha & 1 \end{array} \right)$$

Durch Zeilenumformungen vereinfacht man sie zu

$$[\tilde{A}_\alpha | \tilde{b}] = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 & 6 \end{array} \right).$$

- (a) An der letzten Zeile von $[\tilde{A}_\alpha | \tilde{b}]$ erkennt man, dass das System für alle $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ eindeutig lösbar ist.

Alternativ: Das System ist genau dann eindeutig lösbar, wenn $\det A_\alpha = -2\alpha - 2 \neq 0$ ist, also für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- (b) Aus der obigen Darstellung von $[\tilde{A}_\alpha | \tilde{b}]$ folgt:

$$\text{Rg}(A_\alpha) = 3 \quad \text{für} \quad \alpha \neq -1, \quad \text{Rg}(A_{(-1)}) = 2.$$

- (c) Für $\alpha = -3$ erhalten wir mit den gleichen Umformungen wie oben das Gleichungssystem

$$[\tilde{A}_3 | \tilde{b}] = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 6 \end{array} \right).$$

Mit Rückwärtseinsetzen erhält man jetzt die Lösung:

$$x = (11, 5, -3)^T.$$

(d) Im Fall $x_1 = x_2 = x_3$ folgt aus der zweiten Zeile von $[\tilde{A}_\alpha | \tilde{b}]$, dass $2x = 2$ ist und somit

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1$$

gilt. Aus der dritten Zeile sieht man dann, dass $\alpha = 5$ sein muss.

Einsetzen in die erste Zeile ergibt auch keinen Widerspruch; also ist $(1, 1, 1)^T$ eine Lösung für $\alpha = 5$.

Aufgabe 4 (6 Punkte) Gegeben sei die folgende Quadrik:

$$2x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 - 1 = 0$$

Bestimmen Sie die euklidische Normalform und die Gestalt der Quadrik.

Um die euklidische Normalform der Quadrik zu bestimmen, muss man die Matrixbeschreibung der Quadrik aufstellen:

$$0 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - 1$$

Das charakteristische Polynom von A ist $\chi_A(\lambda) = -9\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3$. Somit sind die Eigenwerte von A $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 3$ und $\lambda_3 = 0$.

Weil die Quadrikgleichung keinen linearen Teil hat, ergibt sich daraus direkt die euklidische Normalform der Quadrik:

$$-3y_1^2 - 3y_2^2 + 1 = 0$$

Die Quadrik ist ein elliptischer Zylinder (bzw. Kreiszylinder, da die Hauptachsen gleiche Länge haben).

Aufgabe 5 (2 Punkte) Bestimmen Sie die Grenzwerte der Folgen.

$$(a) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n^2 + 2}) \qquad (b) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\sin(\pi/4 + 1/n))$$

(a)

$$\begin{aligned} n - \sqrt{n^2 + 2} &= \frac{(n - \sqrt{n^2 + 2})(n + \sqrt{n^2 + 2})}{n + \sqrt{n^2 + 2}} = -\frac{2}{n + \sqrt{n^2 + 2}} \\ \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} n - \sqrt{n^2 + 2} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{2}{n + \sqrt{n^2 + 2}} \underbrace{=}_{\frac{-2}{\infty}} 0. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(\sin(\pi/4 + 1/n)) &\stackrel{\text{ln, sin stetig}}{=} \ln(\sin(\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi/4 + \underbrace{1/n}_{\rightarrow 0})) \\ &= \ln(\sin(\pi/4)) = \ln(\sqrt{2}/2) = -1/2 \ln(2). \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (6 Punkte)

(a) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k}{2^k}$ auf Konvergenz.

(b) Bestimmen Sie den Wert der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{4^k}{k!}$.

(c) Bestimmen Sie den Wert der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5^k} + \frac{(-2)^k}{6^k} \right)$.

(a) Es ist

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{(k+1)^2 + (k+1)}{2^{k+1}} \cdot \frac{2^k}{k^2 + k} = \frac{1}{2} \frac{k^2 + 3k + 2}{k^2 + k}$$

woraus

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1 + 3/k + 2/k^2}{1 + 1/k}}_{\rightarrow 1} = 1/2$$

folgt. Das Quotientenkriterium liefert die Konvergenz der Reihe.

Alternative:

Aus $1 \leq k^2 + k \leq 2k^2$, $k \geq 1$ folgt $\sqrt[k]{1} \leq \sqrt[k]{k^2 + k} \leq \sqrt[k]{2} \sqrt[k]{k^2}$. Wegen $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a} = 1$, $a \in \mathbb{R}^+$ und $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{k} = 1$ folgt weiter mit dem Sandwich-Theorem: $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{k^2 + k} = 1$.

Wir überprüfen nun mit dem Wurzelkriterium, ob wir die Konvergenz entscheiden können:

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{\frac{k^2 + k}{2^k}} = \frac{1}{2} \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \underbrace{\sqrt[k]{k^2 + k}}_{\rightarrow 1} = \frac{1}{2} < 1.$$

Damit folgt die Konvergenz der Reihe.

(b)

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{4^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-4)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-4)^k}{k!} - 1 = \exp(-4) - 1 = 1/e^4 - 1.$$

(c)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{5^k} + \frac{(-2)^k}{6^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^k + \left(-\frac{1}{3} \right)^k$$

Es handelt sich um zwei absolut konvergente geometrische Reihen und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{5^k} + \frac{(-1)^k}{3^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5} \right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \right)^k = \frac{1}{1 - 1/5} + \frac{1}{1 + 1/3} = \frac{5}{4} + \frac{3}{4} = 2.$$

Aufgabe 7 (4 Punkte) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \tan x}{x + \sin x} \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 0+0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$$

(a) Der Grenzwert führt auf einen unbestimmten Ausdruck „ $\frac{0}{0}$ “. Die Regel von l'Hospital ist anwendbar und daher gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \tan x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{\cos^2 x}}{1 + \cos x} = \frac{2}{2} = 1$$

(b)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \exp \left(\ln \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \exp(-\sin x \cdot \ln x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \exp \left(\underbrace{-\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{x \ln x}_{\rightarrow 0} \right) = \exp(0) = e^0 = 1 \end{aligned}$$

Aufgabe 8 (7 Punkte) Gegeben ist die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x^3 - y^2 - 2x.$$

- (a) Bestimmen Sie alle kritischen Stellen von f . Welcher Typ liegt jeweils vor?
(b) Bestimmen Sie alle lokalen Extrema von f auf der Geraden $y = x - 1$.

(a) Mit dem Gradienten

$$\text{grad } f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 2 \\ -2y \end{pmatrix}$$

folgt aus der notwendigen Bedingung $\text{grad } f = 0$:

$$y = 0 \text{ und } x = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Aus der Hesse-Matrix

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

ergibt sich an der Stelle $(\sqrt{6}/3, 0)$ ein Sattelpunkt und an der Stelle $(-\sqrt{6}/3, 0)$ ein Maximum.

(b) Die Gerade lässt sich durch

$$C: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ t - 1 \end{pmatrix}$$

parametrisieren. Damit ist die auf Extrema zu untersuchende Funktion einer Veränderlichen

$$h(t) = f(C(t)) = t^3 - (t - 1)^2 - 2t = t^3 - t^2 - 1$$

mit den Ableitungen

$$h'(t) = 3t^2 - 2t \quad \text{und} \quad h''(t) = 6t - 2.$$

Die notwendige Bedingung $h'(t) = 0$ führt auf

$$t_1 = 0 \quad \text{und} \quad t_2 = \frac{2}{3}$$

mit $h''(t_1) = -2$ und $h''(t_2) = 2$.

Somit sind die lokalen Extrema:

An der Stelle $(0, -1)$ lokales Maximum mit Wert $f(0, -1) = -1$

An der Stelle $(2/3, -1/3)$ lokales Minimum mit Wert $f(2/3, -1/3) = -31/27$

Aufgabe 9 (8 Punkte) Gegeben seien die Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und $\beta \in \mathbb{R}$ sowie das Vektorfeld

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha xy + 3 \sin(y) + 5yz \\ \alpha x^2 + 3x \cos(y) + 5xz \\ \beta xy \end{pmatrix}.$$

- (a) Für welche Parameter α, β besitzt f ein Potential?
 (b) Berechnen Sie ein Potential von f für die Parameterwerte aus (a).
 (c) Sei nun $\beta = 5$ und folgende Parametrisierung der Kurve K gegeben.

$$C: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3: t \mapsto \begin{pmatrix} 1+t \\ t\pi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie alle $\alpha \in \mathbb{R}$ für die

$$\int_K f(s) \bullet ds = 1$$

gilt.

- (a) \mathbb{R}^3 ist einfach zusammenhängend, die hinreichende Bedingung für die Existenz eines Potentials lautet somit

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rot}(f) = \begin{pmatrix} \beta x - 5x \\ 5y - \beta y \\ 2\alpha x + 3 \cos(y) + 5z - 2\alpha x - 3 \cos(y) - 5z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\beta - 5)x \\ (5 - \beta)y \\ 0 \end{pmatrix},$$

also $\alpha \in \mathbb{R}, \beta = 5$.

- (b) Wegen $\operatorname{grad}(U) = f$ gilt zunächst

$$U(x, y, z) = \int 2\alpha xy + 3 \sin(y) + 5yz \, dx = \alpha x^2 y + 3x \sin(y) + 5xyz + c_1(y, z).$$

Mit

$$\frac{d}{dy} U(x, y, z) = \alpha x^2 + 3x \cos(y) + 5xz + \frac{d}{dy} c_1(y, z) \stackrel{!}{=} \alpha x^2 + 3x \cos(y) + 5xz$$

folgt $c_1(y, z) = c_2(z)$ und schließlich

$$\frac{d}{dz} U(x, y, z) = 5xy + \frac{d}{dz} c_2(z) \stackrel{!}{=} 5xy \Rightarrow c_2(z) = c \in \mathbb{R}.$$

Ein Potential ist somit $U(x, y, z) = \alpha x^2 y + 3x \sin(y) + 5xyz$.

(c) Für $\beta = 5$ ist das Kurvenintegral wegunabhängig.

$$1 = \int_K f(s) \bullet ds = U(C(1)) - U(C(0)) = \alpha 4\pi + 6 \sin(\pi) - 0 = \alpha 4\pi$$

Die Bedingung ist somit für $\alpha = \frac{1}{4\pi}$ erfüllt.

Alternative:

Kurvenintegral:

$$\begin{aligned} \int_K f(s) \bullet ds &= \int_0^1 f(C(t)) \bullet C'(t) dt = \int_0^1 \begin{pmatrix} 2\alpha(1+t)t\pi + 3 \sin(t\pi) \\ \alpha(1+t)^2 + 3(1+t) \cos(t\pi) \\ 5(1+t)t\pi \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ \pi \\ 0 \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^1 2\alpha(1+t)t\pi + 3 \sin(t\pi) + \alpha\pi(1+t)^2 + 3\pi(1+t) \cos(t\pi) dt \\ &= \int_0^1 \alpha\pi + 4\alpha\pi t + 3\alpha\pi t^2 + 3 \sin(t\pi) + 3\pi(1+t) \cos(t\pi) dt \\ &= \left[\alpha\pi t + 2\alpha\pi t^2 + \alpha\pi t^3 - \frac{3}{\pi} \cos(t\pi) + 3(1+t) \sin(t\pi) \right]_0^1 - 3 \int_0^1 \sin(t\pi) dt \\ &= \left[\alpha\pi t + 2\alpha\pi t^2 + \alpha\pi t^3 - \frac{3}{\pi} \cos(t\pi) + 3(1+t) \sin(t\pi) \right]_0^1 + \frac{3}{\pi} [\cos(t\pi)]_0^1 \\ &= [\alpha\pi t + 2\alpha\pi t^2 + \alpha\pi t^3 + 3(1+t) \sin(t\pi)]_0^1 \\ &= [\alpha\pi + 2\alpha\pi + \alpha\pi] \\ &= 4\alpha\pi \end{aligned}$$

Die Bedingung ist somit für $\alpha = \frac{1}{4\pi}$ erfüllt.

Name,
Vorname:

Matrikel-
Nummer:

Studien-
gang:

Aufgabe 10 (7 Punkte)

Gegeben ist die Menge $M = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ von vier Vektoren des \mathbb{R}^4 mit

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 16 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

- (a) Stellen Sie v_4 als Linearkombination der Vektoren v_1 und v_2 dar, d.h. bestimmen Sie Parameter $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ so, dass $v_4 = \alpha v_1 + \beta v_2$.

$$\alpha = \boxed{4} \quad \beta = \boxed{3}$$

- (b) Stellen Sie v_4 als Linearkombination der Vektoren v_2 und v_3 dar, d.h. bestimmen Sie Parameter $\gamma, \delta \in \mathbb{R}$ so, dass $v_4 = \gamma v_2 + \delta v_3$.

$$\gamma = \boxed{5} \quad \delta = \boxed{2}$$

- (c) Geben Sie eine Basis $B \subseteq M$ des von M erzeugten Vektorraums $W = L(M)$ aus Vektoren von M an.

$$B : \boxed{\{v_1, v_2\} \text{ oder beliebige andere zwei}}$$

- (d) Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis \tilde{B} für W in dem Sie das Schmidtsche Orthonormierungsverfahren auf die Basis B anwenden.

$$\tilde{B} : \boxed{\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}v_1, \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, 1)^T \right\} \text{ bzw. andere je nach Wahl der Basis}}$$

Aufgabe 11 (2 Punkte) Bestimmen Sie folgende Ableitungen in den jeweiligen Definitionsbereichen.

$\frac{d}{dx} x e^{2x} =$	$(2x + 1)e^{2x}$
$\frac{d}{dx} \frac{x - 3}{(x + 1)^2} =$	$\frac{-x + 7}{(x + 1)^3}$

Aufgabe 12 (4 Punkte) Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a + bi & 1 & 0 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \quad \text{mit } a, b \in \mathbb{R}.$$

(a) Geben Sie die Determinante von A in Abhängigkeit von a und b an.

$$\det A = \boxed{a + bi}$$

(b) Für welche Paare $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ haben alle Eigenwerte die algebraische Vielfachheit 1?

$$\boxed{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 1), (0, -1)\}}$$

(c) Für welche Werte von a und b ist der Vektor $\begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor?

$$(a, b) = \boxed{(0, 2)}$$

Aufgabe 13 (3 Punkte) Bestimmen Sie das Taylorpolynom der Stufe 3 der folgenden Funktionen um den angegebenen Entwicklungspunkt x_0 .

(a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \cos(x/2), \quad x_0 = 0$

$$T_3(f, x, 0) = \boxed{1 - \frac{1}{8}x^2 .}$$

(b) $g: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \ln(x^2), \quad x_0 = 1$

$$T_3(g, x, 1) = \boxed{2(x - 1) - (x - 1)^2 + \frac{2}{3}(x - 1)^3}$$

Aufgabe 14 (6 Punkte) Berechnen Sie folgende Integrale.

$$\int (x+1)(5e^x - \sin(2x)) \, dx = \left[5xe^x + \frac{1}{2}(x+1)\cos(2x) - \frac{1}{4}\sin(2x) \right]$$

$$\int \cos(x) (\sin(x)^3 + 3\sin(x)^2 + 3\sin(x) + 1) \, dx = \left[\frac{1}{4}(\sin(x) + 1)^4 \right]$$

$$\int \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x - 1} \, dx = [\ln |x^3 + 2x - 1|]$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{3x^2 + 2}{x^3 + 2x - 1} \, dx = \ln \left(\frac{4}{13} \right)$$

Name,

Matrikel-

Studien-

Vorname:

Nummer:

gang:

Aufgabe 15 (7 Punkte) Bestimmen Sie für die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto \sin(x)e^{x-y}$$

den Gradienten

$$\text{grad } f(x, y) = \begin{pmatrix} \boxed{(\cos(x) + \sin(x)) e^{x-y}} \\ \boxed{-\sin(x)e^{x-y}} \end{pmatrix}$$

und die Hesse-Matrix

$$H f(x, y) = \begin{pmatrix} \boxed{2 \cos(x)e^{x-y}} & \boxed{-(\cos(x) + \sin(x))e^{x-y}} \\ \boxed{-(\cos(x) + \sin(x))e^{x-y}} & \boxed{\sin(x)e^{x-y}} \end{pmatrix} .$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom $T_2(f, (x, y), (\pi/2, 1))$ der zweiten Stufe um den Entwicklungspunkt $(x_0, y_0) = (\pi/2, 1)$.

$$T_2(f, (x, y), (\pi/2, 1)) = \boxed{e^{\frac{\pi}{2}-1} \left(1 + (x - \frac{\pi}{2}) - (y - 1) - (y - 1)(x - \frac{\pi}{2}) + \frac{1}{2}(y - 1)^2 \right)}$$