23

Der Satz von Stokes

Wir übertragen nun den Fundamentalsatz von Ketten im $\mathbb{R}^n$ auf n -dimensionale orientierte Mannigfaltigkeiten M mit Rand, die in einem beliebigen euklidischen Raum eingebettet sind. Der Fundamentalsatz erhält dann die Form

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

und wird als allgemeiner Satz von Stokes bezeichnet.

Für 3- und 2-dimensionale berandete Mannigfaltigkeiten enthält dieser den Satz von Gauss – auch Divergenzsatz genannt – und den klassischen Satz von Stokes als Spezialfälle, welche wir abschließend mithilfe der klassischen Linien-, Flächen- und Volumenelemente formulieren. In diesem Zusammenhang treten auch die Divergenz und Rotation eines Vektorfeldes auf. Diese Bezeichnungen erhalten hier ihre Berechtigung.

Abb 1
Satz von Stokes

23.1

Mannigfaltigkeiten

Bisher betrachteten wir *gleichungsdefinierte Mannigfaltigkeiten*. Demnach ist eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^{n+m}$ eine f -definierte Mannigfaltigkeit der Dimension n , wenn es eine stetig differenzierbare Abbildung $f: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit regulärem Wert 0 gibt, so dass

$$M = f^{-1}(0).$$

Kurz, M ist die Niveaumenge eines regulären Wertes einer glatten Funktion.

Wir verallgemeinern dieses Konzept nun dahingehend, dass wir dies von einer Mannigfaltigkeit nur noch *lokal* um jedem Punkt fordern. Dabei stehe im Folgenden *differenzierbar* der Einfachheit halber für *unendlich oft differenzierbar*.

Definition Eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^{n+m}$ heißt *n-dimensionale Mannigfaltigkeit* oder kurz *n-Mannigfaltigkeit*, wenn zu jedem Punkt $p \in M$ eine Umgebung $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ und eine differenzierbare Abbildung $f: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit regulärem Wert 0 existiert, so dass

$$M \cap W = f^{-1}(0). \quad \times$$

Aufgrund des Niveaufächensatzes _{19.17} ist dies, lokal um jeden Punkt, äquivalent zur Existenz einer differenzierbaren Abbildung $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, so dass

$$M \cap W = \Gamma(\phi)$$

der Graph von ϕ ist. Für das praktische Arbeiten mit Mannigfaltigkeiten ist allerdings folgende Charakterisierung nützlicher.

- 1 **Satz** Eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^{n+m}$ ist eine *n-Mannigfaltigkeit* genau dann, wenn es zu jedem Punkt $p \in M$ eine Umgebung $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ und einen Diffeomorphismus $h: W \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ gibt, so dass

$$h(M \cap W) \subset \mathbb{R}^n \times 0^m. \quad \times$$

Man sagt, der Diffeomorphismus h *trivialisert* die Mannigfaltigkeit um p .

⟨⟨⟨ ⇒ Nach Umordnung der Koordinaten können wir annehmen, dass

$$p = (u_0, v_0) \in U \times V = W \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \quad M \cap W = \Gamma(\phi)$$

mit einer differenzierbaren Abbildung $\phi: U \rightarrow V$ mit $\phi(u_0) = v_0$. Setzen wir

$$h: U \times V \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \quad (u, v) \mapsto (x, y) = (u, v - \phi(u)),$$

so ist h injektiv und die Jacobimatrix Dh in jedem Punkt regulär. Also ist h ein Diffeomorphismus von W auf eine offene Teilmenge in $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ mit der

Abb 2 Ein- und zweidimensionale Mannigfaltigkeiten

Eigenschaft, dass

$$\begin{aligned} h(M \cap W) &= \{h(u, v) : (u, v) \in \Gamma(\varphi)\} \\ &= \{(x, y) : x \in U, y = 0\} \subset \mathbb{R}^n \times 0^m. \end{aligned}$$

⇐ Sei W eine Umgebung von p und $h: W \rightarrow \Omega$ ein solcher Diffeomorphismus. Setzen wir

$$f = (h_{n+1}, \dots, h_{n+m}) : W \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

so ist f differenzierbar und $f(M \cap W) = 0^m$. Außerdem ist 0^m ein regulärer Wert, da der Rang von Dh in allen Punkten maximal ist. >>>>

Eine Mannigfaltigkeit lässt sich auch durch die Existenz *lokaler Koordinaten* wie folgt charakterisieren.

- 2 **Satz** Eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^{n+m}$ ist eine n -Mannigfaltigkeit genau dann, wenn es zu jedem Punkt $p \in M$ eine Umgebung $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$, ein Gebiet $U \subset \mathbb{R}^n$ und eine differenzierbare Abbildung $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ mit folgenden Eigenschaften gibt:

(K-1) φ ist injektiv mit $\text{rang } D\varphi \equiv n$,

(K-2) $\varphi(U) = M \cap W$,

(K-3) $\varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow U$ ist stetig.

Eine solche Abbildung φ heißt *lokales Koordinatensystem* oder *Karte* um p . ✕

Abb 3 Ein- und zweidimensionales Koordinatensystem

««« Ist M eine n -Mannigfaltigkeit, so existiert um jeden Punkt $p \in M$ eine Umgebung $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ und eine differenzierbare Abbildung $\phi: \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}^m$, so dass $M \cap W = \Gamma(\phi)$. Dann ist

$$\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}, \quad \varphi(x) = (x, \phi(x))$$

offensichtlich ein Koordinatensystem um p .

Sei nun umgekehrt W eine Umgebung von p und $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ eine Abbildung mit den Eigenschaften (K-1)-(K-3). Wir können dann die Koordinaten in $\mathbb{R}^{n+m}$ so umordnen, dass die Jacobimatrix von

$$\chi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$$

im Punkt $a = \varphi^{-1}(p)$ regulär ist. Verkleinern wir nötigenfalls U , so erhalten wir einen Diffeomorphismus $\chi: U \rightarrow \tilde{U}$,

$$\tilde{\varphi} = \varphi \circ \chi^{-1}: \tilde{U} \rightarrow W$$

ist die Identität in den ersten n Koordinaten, und es gilt

$$\varphi(U) = \tilde{\varphi}(\tilde{U}) = \Gamma(\phi),$$

wenn ϕ aus den letzten m Koordinaten von $\tilde{\varphi}$ besteht.

Außerdem existiert eine Umgebung W von p , so dass $\Gamma(\phi) = M \cap W$. Denn andernfalls gäbe es eine Folge (p_k) von Punkten auf M mit $p_k \rightarrow p$ und $\varphi^{-1}(p_k) \notin U$. Dann aber ist φ^{-1} im Punkt p nicht stetig, im Widerspruch zu Annahme (K-3). Also ist M eine n -Mannigfaltigkeit. »»»

Abb 4 Keine Mannigfaltigkeit

Bemerkung Bedingung (κ-3) ist erforderlich, um Gebilde wie in Abbildung 4 als Mannigfaltigkeit auszuschließen. Jede Umgebung W von p enthält auch Punkte auf den gestrichelten Ende von M , die gegen p konvergieren. Entlang dieser Folge konvergiert φ^{-1} jedoch nicht gegen $\varphi^{-1}(p)$, ist also unstetig. $\rightarrow$

► *Beispiele für Mannigfaltigkeiten* A. Jede gleichungsdefinierte Mannigfaltigkeit im Sinne von Abschnitt 19.3 ist auch eine Mannigfaltigkeit in diesem Sinne. Die dortigen Beispiele sind also auch hier gültig.

B. Insbesondere ist jede 1-Punkt-Menge eine 0-Mannigfaltigkeit.

C. Jede offene Teilmenge des $\mathbb{R}^n$ ist eine n -Mannigfaltigkeit. Als n -dimensionales Koordinatensystem um jeden Punkt genügt die Identitätsabbildung.

D. Die Oberfläche eines 2-Torus ist eine kompakte 2-Mannigfaltigkeit. ◀

Wir halten noch fest, dass der Wechsel zwischen zwei Koordinatensystemen einen Diffeomorphismus definiert ist, wenn sich ihre Kartengebiete überlappen.

3 **Lemma** Sei M eine n -Mannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^{n+m}$. Sind

$$\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}, \quad \alpha = 1, 2,$$

zwei überlappende Koordinatensysteme von M , also die Mengen

$$V_\alpha = \varphi_\alpha^{-1}(\varphi_1(U_1) \cap \varphi_2(U_2)), \quad \alpha = 1, 2,$$

nicht leer, so sind die beiden Koordinatenwechsel

$$\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 : V_1 \rightarrow V_2, \quad \varphi_1^{-1} \circ \varphi_2 : V_2 \rightarrow V_1,$$

n -dimensionale Diffeomorphismen. ✕

⟨⟨⟨ Mit den Bezeichnungen des vorangehenden Beweises ist

$$\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1 = \pi_n \circ h_2 \circ \varphi_1 = \pi_n \circ h_2 \circ \psi_1|_{U_1 \times 0^m},$$

wobei π_n die Projektion auf die ersten n Koordinaten bezeichnet. Es ist dann

$$\det D(\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1)(a_1) \neq 0.$$

Abb 5 Koordinatenwechsel

Somit ist $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ ein lokaler Diffeomorphismus um a_1 . — Aus Symmetriegründen gilt Entsprechendes auch für $\varphi_1^{-1} \circ \varphi_2$. $\gggg$

■ Mannigfaltigkeiten mit Rand

Jeder Punkt einer n -Mannigfaltigkeit M ist umgeben von einem n -dimensionalen Kartengebiet. In diesem Sinne ist jeder Punkt von M ein *innerer Punkt* von M und kein *Randpunkt*. Für den Satz von Stokes benötigen wir aber auch *Mannigfaltigkeiten mit Rand*.

Das euklidische Modell hierfür ist der abgeschlossene Halbraum

$$\mathbb{H}^n := \{x \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}.$$

Jeder Punkt x in $\mathbb{H}^n$ mit $x_n > 0$ ist ein innerer Punkt von $\mathbb{H}^n$, und der Rand dieses Halbraums ist die Hyperebene

$$\partial\mathbb{H}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x_n = 0\} = \mathbb{R}^{n-1} \times 0^1.$$

So ist $\mathbb{H}^1$ das abgeschlossene Intervall $[0, \infty)$, und $\mathbb{H}^2$ die obere abgeschlossene Halbebene.

Abb 6 Eindimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand

Abb 7 Zweidimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand

- 4 **Definition** Eine nichtleere Teilmenge M des $\mathbb{R}^{n+m}$ heißt *n-dimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand* oder kurz *berandete n-Mannigfaltigkeit*, wenn es zu jedem Punkt $p \in M$ eine Umgebung $W \subset \mathbb{R}^{n+m}$ und einen Diffeomorphismus $h: W \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ gibt, so dass entweder

$$h(M \cap W) \subset \mathbb{R}^n \times 0^m \quad (t)$$

oder

$$h(M \cap W) \subset \mathbb{H}^n \times 0^m, \quad h(p) \in \partial\mathbb{H}^n \times 0^m. \quad (\delta)$$

Der *Rand* ∂M von M besteht aus allen Punkten in M mit Eigenschaft (δ) . $\times$

Man beachte, dass beide Bedingungen nicht gleichzeitig erfüllt sein können. Denn gäbe es um ein und denselben Punkt p Diffeomorphismen h_t und h_δ mit den jeweiligen Eigenschaften, so wäre $h_\delta \circ h_t^{-1}$ ein Diffeomorphismus, der eine offene Umgebung von $h_t(p)$ auf eine nicht-offene Umgebung von $h_\delta(p)$ abbildet, was nicht möglich ist.

► A. Jede Mannigfaltigkeit ist auch eine Mannigfaltigkeit mit Rand, ihr Rand ist in diesem Fall leer.

B. Jede abgeschlossene n -dimensionale Kugel im $\mathbb{R}^n$ ist eine kompakte berandete n -Mannigfaltigkeit, ihr Rand ist eine $n - 1$ -dimensionale Sphäre.

C. Ein Volltorus ist eine kompakte berandete 3-Mannigfaltigkeit, sein Rand ist ein ›hohler‹ 2-dimensionaler Torus. ◀

Achtung Der Mannigfaltigkeiten-Rand ist nicht zu verwechseln mit dem topologischen Rand _{10.4}. Ist zum Beispiel D eine abgeschlossene Kreisscheibe im $\mathbb{R}^3$, so ist ihr Mannigfaltigkeiten-Rand eine Kreiskurve, aber ihr topologischer Rand ist ganz D . $\rightarrow$

23.2

Vektorfelder, Formen und Orientierung

Ausgehend von der Beschreibung einer Mannigfaltigkeit durch lokale Koordinaten definieren wir nun Konstrukte wie Tangentialräume, Differenzialformen und Orientierungen auf Mannigfaltigkeiten.

■ **Tangentialbündel und Vektorfelder**

Sei M eine n -Mannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^{n+m}$ und

$$\varphi : \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow W \subset \mathbb{R}^{n+m}$$

ein lokales Koordinatensystem um einen Punkt $p \in M$. Der Tangentialraum im Punkt $a = \varphi^{-1}(p)$ ist der Raum $\mathbb{R}^n$ selbst, den wir uns mit seinem Nullpunkt an den Punkt a angeheftet vorstellen. Die Tangentialabbildung $\varphi_* := D\varphi$ bildet diesen in einen Unterraum des $\mathbb{R}^{n+m}$ ab, den wir uns mit seinem Nullpunkt am Punkt p angeheftet vorstellen. Diese Abbildung

$$\varphi_* : T_a \mathbb{R}^n \rightarrow T_p \mathbb{R}^{n+m}, \quad v \mapsto D\varphi(a) v$$

ist injektiv, da $D\varphi$ maximalen Rang hat.

Das Bild $\varphi_*(T_a \mathbb{R}^n)$ ist also ein n -dimensionaler Unterraum von $T_p \mathbb{R}^{n+m}$. Dieser Raum hängt *nicht* von der Wahl der Koordinaten ab. Ist $\tilde{\varphi} : \tilde{U} \rightarrow W$ ein weiteres Koordinatensystem um p , so ist

$$\chi = \tilde{\varphi}^{-1} \circ \varphi : \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$$

ein lokaler Diffeomorphismus um a . Damit ist

$$\varphi = \tilde{\varphi} \circ \chi, \quad \varphi_* = \tilde{\varphi}_* \circ \chi_*.$$

Da χ_* den Raum $T_a \mathbb{R}^n$ isomorph auf den Raum $T_{\tilde{a}} \mathbb{R}^n$ mit $\tilde{a} = \chi(a)$ abbildet, folgt

$$\varphi_*(T_a \mathbb{R}^n) = \tilde{\varphi}_*(T_{\tilde{a}} \mathbb{R}^n).$$

Abb 8 Tangentialräume

Somit hängt dieser Raum nicht vom Koordinatensystem ab, und folgende Definition ist gerechtfertigt.

Definition Sei M eine n -Mannigfaltigkeit. Ist $\varphi: U \rightarrow W$ ein Koordinatensystem um $p = \varphi(a) \in M$, so heißt

$$T_p M := \varphi_*(T_a \mathbb{R}^n)$$

der *Tangentialraum* von M an der Stelle p . Die Vereinigung

$$TM := \bigcup_{p \in M} T_p M$$

aller dieser Tangentialräume heißt das *Tangentialbündel* von M . $\times$

Für gleichungsdefinierte Mannigfaltigkeiten stimmt diese Definition mit der früheren ^{19,23} überein.

Definition Ein *Vektorfeld* auf einer Mannigfaltigkeit M ist eine Abbildung

$$F: M \rightarrow TM$$

mit der Eigenschaft, dass $F(p) \in T_p M$ für alle $p \in M$. $\times$

Ein Vektorfeld $F: M \rightarrow TM$ ordnet also jedem Punkt $p \in M$ einen Vektor im darüberliegenden Tangentialraum $T_p M$ zu. Ist

$$\pi: TM \rightarrow M, \quad T_p M \mapsto p$$

die kanonische Projektion des Tangentialbündels auf den Fußpunkt eines jeden Tangentialraumes, so gilt also

$$\pi \circ F = id_M.$$

Abbildungen dieser Art werden als *Schnitte* in einem Bündel über M bezeichnet.

Ein Vektorfeld F auf M ist nicht notwendigerweise auf einer Umgebung von M erklärt. Somit ist *a priori* nicht klar, wann F differenzierbar heißen soll. Dazu greifen wir auf lokale Koordinatensysteme zurück. — In jedem lokalen Koordinatensystem $\varphi: U \rightarrow W$ existiert ein eindeutiges Vektorfeld G auf U mit

$$F \circ \varphi = D\varphi \cdot G.$$

Für dieses Vektorfeld schreibt man auch

$$\varphi^* F := D\varphi^{-1} F \circ \varphi: U \rightarrow TU$$

und nennt es das auf U *zurückgeholte Vektorfeld*. Wir *definieren* dann ein Vektorfeld auf M als *differenzierbar*, wenn es zu jedem Punkt ein Koordinatensystem gibt, in dem das zurückgeholte Vektorfeld im üblichen Sinne differenzierbar ist.

Da der Wechsel zwischen verschiedenen Koordinatensystemen differenzierbar ist, hängt diese Definition nicht von deren Wahl ab.

■ Differenzialformen

Fassen wir den Tangentialraum $T_p M$ als Unterraum von $T_p \mathbb{R}^{n+m}$ auf, so ist der Raum $\Lambda_p^k M$ der alternierenden k -Formen im Punkt p nichts anderes als die Einschränkung dieser k -Formen auf $T_p M$. Das Bündel aller dieser Räume ist

$$\Lambda^k M := \bigcup_{p \in M} \Lambda_p^k M.$$

Eine *Differenzialform vom Grad k* oder kurz *k -Form* auf einer Mannigfaltigkeit M ist dann eine Abbildung

$$\omega : M \rightarrow \Lambda^k M$$

mit der Eigenschaft, dass $\pi \circ \omega = id_M$. Diese können wir darstellen als

$$\omega = \sum_{1 \leq \mu_1 < \dots < \mu_k \leq n+m} \omega_{\mu_1 \dots \mu_k} dx_{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx_{\mu_k},$$

wobei die Komponentenfunktionen im Allgemeinen nur auf M erklärt sind. Differenzierbarkeit und äußere Ableitung müssen wir daher wieder durch Rückgriff auf lokale Koordinaten erklären.

So heißt ω differenzierbar, wenn es zu jedem Punkt ein Koordinatensystem gibt, in dem die zurückgeholte Form im üblichen Sinne differenzierbar ist. Da der Wechsel zwischen verschiedenen Koordinatensystemen differenzierbar ist, hängt diese Definition nicht von deren Wahl ab. Etwas mehr Sorgfalt erfordert die Definition der äußeren Ableitung.

- 5 **Satz und Definition** *Zu jeder differenzierbaren k -Form ω auf einer Mannigfaltigkeit M existiert genau eine $k+1$ -Form $d\omega$ auf M , so dass*

$$\varphi^*(d\omega) = d(\varphi^*\omega)$$

*in jedem Koordinatensystem φ auf M . Diese Form heißt die **äußere Ableitung** von ω . ✕*

⟨⟨⟨ Wir definieren $d\omega$ durch seine Wirkung auf $k+1$ Tangentialvektoren

$$w_1, \dots, w_{k+1} \in T_p M.$$

In einem Koordinatensystem φ um $p = \varphi(a)$ gehen diese über in die Vektoren

$$v_\mu = \varphi^* w_\mu \in T_a \mathbb{R}^n, \quad 1 \leq \mu \leq k+1.$$

Abb 9
Zwei Kartengebiete
mit Orientierung

Existierte das äußere Differenzial $d\omega$ in der üblichen Weise, so wäre nun ^{22.12}

$$\begin{aligned} d\omega(w_1, \dots, w_{k+1}) &= d\omega(\varphi_*v_1, \dots, \varphi_*v_{k+1}) \\ &= (\varphi^*d\omega)(v_1, \dots, v_{k+1}) \\ &= d(\varphi^*\omega)(v_1, \dots, v_{k+1}). \end{aligned}$$

Der letzte Ausdruck existiert aber in jedem Fall, wenn wir ω als differenzierbar voraussetzen. Wir *definieren* also die $k+1$ -form $d\omega$ durch

$$d\omega(w_1, \dots, w_{k+1}) := d(\varphi^*\omega)(\varphi^*w_1, \dots, \varphi^*w_{k+1}).$$

In der üblichen Weise zeigt man, dass dies nicht von der Wahl des Koordinatensystems abhängt. $\gggg$

■ Orientierung

Für die Integrationstheorie und den Satz von Stokes müssen wir Mannigfaltigkeiten noch mit einer Orientierung versehen. Dazu treffen wir folgende

Vereinbarung Der euklidische Raum $\mathbb{R}^n$ sei mit der Orientierung der Standardbasis $[e_1, \dots, e_n]$ sowie dem Standardskalarprodukt $\langle v, w \rangle$ versehen. $\times$

Einem einzelnen Punkt p einer Mannigfaltigkeit M ordnen wir eine Orientierung zu, indem wir den Tangentialraum T_pM mit einer Orientierung

$$\varrho(p) := [v_1, \dots, v_n](p)$$

versehen, also eine angeordnete Basis $(v_1, \dots, v_n)$ von T_pM auswählen. Natürlich ist es nicht sinnvoll, dabei völlig willkürlich vorzugehen. Vielmehr sollte die Wahl dieser Orientierungen in einer konsistenten Weise erfolgen.

Innerhalb *eines* Koordinatensystems φ ist dies kein Problem. Hier nennen wir eine Wahl von Orientierungen konsistent, wenn auf dem gesamten Kartengebiet entweder $\varrho = [\varphi_*e_1, \dots, \varphi_*e_n]$ oder $\varrho = -[\varphi_*e_1, \dots, \varphi_*e_n]$ gilt – also *alle*

Abb 10

Das Möbiusband

Orientierungen entweder mit der Standardorientierung des $\mathbb{R}^n$ übereinstimmen oder entgegengesetzt sind.

Eine solche konsistente Wahl können wir immer erreichen, indem wir ϱ auf dem Kartengebiet auf eine dieser beiden Weisen einfach *festlegen*. Haben wir aber eine solche Wahl getroffen, so pflanzt sie sich über überlappende Koordinatensysteme hinweg auf ganz M fort. Und dies kann zu Konflikten führen.

► Das *Möbiusband* entsteht, indem man die Enden eines Papierstreifen nach einer halben Drehung zusammenklebt. Beide Seiten des Papierbandes bilden dann eine einzige Fläche. Diese ist *nicht orientierbar*. Denn wählen wir in einem beliebigen Punkt p eine Orientierung, so führt deren stetige Fortsetzung nach einem Umlauf um das Band zur entgegengesetzten Orientierung in p . Eine überall konsistente Wahl von Orientierungen ist daher nicht möglich. ◀

Definition Eine Mannigfaltigkeit M heißt *orientierbar*, wenn jedem Punkt eine Orientierung so zugeordnet werden kann, dass sie in jedem lokalen Koordinatensystem konsistent ist. Eine Mannigfaltigkeit mit einer solchen Wahl heißt *orientierte Mannigfaltigkeit*. ✕

► Eine gleichungsdefinierte Mannigfaltigkeit $M = f^{-1}(0)$ ist orientierbar. Denn die Gradienten der Komponentenfunktionen,

$$n_k = \nabla f_k, \quad 1 \leq k \leq m,$$

bilden eine stetige Familie von Normalenvektoren an M und fixieren damit eine konsistente Orientierung $[n_1, \dots, n_m]$ des Normalenbündels $T^\perp M$. Dies induziert eine konsistente Orientierung $[\nu_1, \dots, \nu_n]$ des Tangentialbündels, indem wir fordern, dass

$$[\nu_1, \dots, \nu_n, n_1, \dots, n_m] = [e_1, \dots, e_{n+m}]. \quad \blacktriangleleft$$

Abb 11

Tangentialraum und
äußere Normale an
einem Randpunkt

■ Mannigfaltigkeiten mit Rand

Unsere Definitionen von Tangentialraum, Vektorfeldern und Differentialformen übertragen sich ohne große Mühe auf Mannigfaltigkeiten mit Rand. Bei der Orientierung ergibt sich dabei ein zusätzlicher Aspekt.

Sei M eine n -Mannigfaltigkeit mit Rand. Dann ist ∂M eine Mannigfaltigkeit der Dimension $n - 1$, denn in jedem Koordinatensystem um einen Randpunkt p von M ist er das Bild eines Teils von $\partial\mathbb{H}^n$. Für die Tangentialräume gilt daher

$$T_p(\partial M) \subset T_p M.$$

Genauer ist $T_p(\partial M)$ ein linearer Unterraum von $T_p M$ der Kodimension 1. Somit ist $T_p^\perp(\partial M) \cap T_p M$ ein eindimensionaler Unterraum, und es existieren genau zwei normierte Tangentialvektoren, die senkrecht auf der Randmannigfaltigkeit stehen. Von diesen zeigt genau einer nach *außen*. In einem Koordinatensystem φ um den Randpunkt p ist dies gleichbedeutend damit, dass die letzte Komponente des zurückgeholtten Normalenvektors $\varphi^* n(p)$ negativ ist. Diese Charakterisierung ist koordinatenunabhängig, denn jedes Koordinatensystem um einen Randpunkt bildet sowohl $\partial\mathbb{H}^n$ als auch $\mathbb{H}^n$ in sich ab.

- 6 **Satz und Definition** Ist M eine Mannigfaltigkeit mit Rand, so existiert in jedem Randpunkt p von M ein eindeutiger *auswärts gerichteter Normaleneinheitsvektor* $n(p)$, kurz *äußere Normale* genannt. $\times$

Mithilfe der äußeren Normalen können wir auf einer *orientierten* Mannigfaltigkeit mit Rand eine eindeutige *induzierte Orientierung* des Randes erklären.

- 7 **Satz und Definition** Sei M eine orientierte Mannigfaltigkeit mit Rand. Dann ist auch der Rand ∂M eine orientierte Mannigfaltigkeit, und die *induzierte Orientierung* $\partial\varrho$ im Punkt $p \in \partial M$ ist gegeben durch

$$(\partial\varrho)(p) = [\nu_1, \dots, \nu_{n-1}]$$

Abb 12

Induzierte
Orientierung des Randes

mit denjenigen Basen $(v_1, \dots, v_{n-1})$ von $T_p \partial M$, für die

$$[n, v_1, \dots, v_{n-1}](p) = \varrho(p). \quad \times$$

⟨⟨⟨ Damit diese Festlegung sinnvoll ist, müssen wir zeigen, dass verschiedene Basen von $T_p \partial M$ mit dieser Eigenschaft gleichorientiert sind. Seien also $(v_1, \dots, v_{n-1})$ und $(w_1, \dots, w_{n-1})$ zwei Basen von $T_p \partial M$ mit

$$[n, v_1, \dots, v_{n-1}] = [n, w_1, \dots, w_{n-1}].$$

Ein Basiswechsel zwischen diesen beiden Basen ist eine lineare Transformation T mit $\det T > 0$ und $Tn = n$. Also hat T die Blockmatrixdarstellung

$$T = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

mit einer $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix A . Also ist auch $\det A > 0$ und somit

$$[v_1, \dots, v_{n-1}] = [w_1, \dots, w_{n-1}]. \quad \gggg$$

Bemerkung Die Bedingung an den Vektor n ist so gewählt, dass der Rand einer zweidimensionalen Mannigfaltigkeit in der Ebene *positiv*, und die Oberfläche einer Kugel, von außen gesehen, wie die euklidische Ebene orientiert ist Abb 13. $\rightarrow$

Abb 13

Induzierte Orientierung
des Randes einer Fläche
und des Volltorus

23.3 Der Satz von Stokes

Wir betrachten nun das Integral einer n -Form ω über eine n -Mannigfaltigkeit M . Dabei betrachten wir zuerst den Fall, dass der Träger von ω ganz in einem n -Würfel c enthalten ist, der sich durch Einschränkung eines Koordinatensystem φ auf den Standardwürfel ergibt, also durch

$$c = \varphi|_{\mathbb{I}^n}$$

gegeben ist. Dies ist keine wesentliche Einschränkung, da sich jedes Koordinatensystem durch Verschieben und Strecken der Koordinaten in ein Koordinatensystem $\varphi: U \rightarrow W$ mit $U \supset \mathbb{I}^n$ überführen lässt. Ist M orientierbar, so heißt c *orientierungserhaltend*, wenn es φ ist. Nur solche Würfel wollen wir im Folgenden betrachten und definieren hierfür

$$\int_M \omega := \int_c \omega = \int_{\mathbb{I}^n} c^* \omega = \int_{\mathbb{I}^n} \varphi^* \omega.$$

Dieses Integral hängt nicht vom Koordinatensystem ab.

- 8 **Lemma** Sei ω eine n -Form auf der orientierten n -Mannigfaltigkeit M . Sind c_1 und c_2 zwei orientierungserhaltende n -Würfel in M und

$$\text{supp } \omega \subset c_1(\mathbb{I}^n) \cap c_2(\mathbb{I}^n),$$

so gilt

$$\int_{c_1} \omega = \int_{c_2} \omega. \quad \times$$

⟨⟨⟨ Sei $V_\alpha = c_\alpha^{-1}(\text{supp } \omega)$ für $\alpha = 1, 2$. Dann ist

$$\chi := c_2^{-1} \circ c_1 : V_1 \rightarrow V_2$$

ein Diffeomorphismus mit $c_1 = c_2 \circ \chi$, und es gilt

$$\int_{c_1} \omega = \int_{\mathbb{I}^n} c_1^* \omega = \int_{V_1} c_1^* \omega = \int_{V_1} \chi^* c_2^* \omega.$$

Hierbei ist $c_2^* \omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ mit einer Funktion f auf V_2 und 22.10

$$\chi^*(f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n) = (f \circ \chi)(\det D\chi) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Da der Koordinatenwechsel χ die Orientierung erhält, gilt

$$\det D\chi = |\det D\chi| > 0.$$

Abb 14 Träger von ω in zwei Kartengebieten

Mit der Transformationsformel 21.14 und $\chi(V_1) = V_2$ folgt daher weiter

$$\begin{aligned}
 \int_{V_1} \chi^* c_2^* \omega &= \int_{V_1} \chi^* (f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n) \\
 &= \int_{V_1} (f \circ \chi) |\det D\chi| d\lambda_n \\
 &= \int_{V_2} f d\lambda_n \\
 &= \int_{\mathbb{I}^n} c_2^* \omega \\
 &= \int_{c_2} \omega. \quad \gggg
 \end{aligned}$$

■ Der allgemeine Fall

Im Allgemeinen wird $\text{supp } \omega$ allerdings nicht in einem einzigen Koordinatensystem enthalten sein – sonst wäre der ganze Aufwand mit den Mannigfaltigkeiten ja auch nicht nötig. Diesen Fall behandeln wir mithilfe einer Zerlegung der Eins. Dabei betrachten wir nur solche Zerlegungen $\mathcal{T}$, wo der Träger jeder Zerlegungsfunktion $\tau \in \mathcal{T}$ ganz im Bild eines n -Würfels enthalten ist. Dies lässt sich immer erreichen, indem man die Zerlegung der Eins einer Überdeckung von M durch Kartengebiete unterordnet.

Definition und Satz Sei $\mathcal{T}$ eine Zerlegung der Eins auf M so, dass für jedes τ ein n -Würfel $c: \mathbb{I}^n \rightarrow M$ existiert mit

$$\text{supp } \tau \subset c(\mathbb{I}^n).$$

Für eine n -Form ω auf M sei dann

$$\int_M \omega := \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_M \tau \omega,$$

falls diese Reihe konvergiert. Dieses Integral ist unabhängig von $\mathcal{T}$. $\times$

⟨⟨⟨ Sei $\mathcal{S}$ eine zweite Zerlegung der Eins auf M mit der geforderten Träger-Eigenschaft. Da der Träger jeder Zerlegungsfunktion kompakt und jede Zerlegung lokal endlich ist, sind für jedes $\tau \in \mathcal{T}$ und jedes $\sigma \in \mathcal{S}$ auch die Mengen

$$\mathcal{S}_\tau = \{\sigma \in \mathcal{S} : \sigma \tau \neq 0\}, \quad \mathcal{T}_\sigma = \{\tau \in \mathcal{T} : \tau \sigma \neq 0\}$$

endlich 21.5. Daher gilt

$$\tau = \tau \sum_{\sigma \in \mathcal{S}} \sigma = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_\tau} \tau \sigma, \quad \sigma = \sigma \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \tau = \sum_{\tau \in \mathcal{T}_\sigma} \sigma \tau,$$

wobei jede Summe endlich ist. Folglich gilt auch

$$\begin{aligned} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_M \tau \omega &= \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_\tau} \int_M \tau \sigma \omega \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_\sigma} \int_M \sigma \tau \omega = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}} \int_M \sigma \omega. \end{aligned}$$

Daraus folgt die Behauptung. $\rangle\rangle\rangle$

Genau dieselben Definitionen gelten auch für Mannigfaltigkeiten mit Rand. Dabei ergeben sich keine neuen Schwierigkeiten. Wir sind daher jetzt in der Lage, den Satz von Stokes auf Mannigfaltigkeiten zu formulieren und zu beweisen.

- 9 **Allgemeiner Satz von Stokes** Sei M eine kompakte, orientierte, n -dimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand. Für eine $n - 1$ -Form ω auf M gilt dann

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega,$$

wobei ∂M mit der von M induzierten Orientierung versehen ist. $\times$

⟨⟨⟨ Der Beweis erfolgt in drei Schritten - zwei Spezialfälle innerhalb eines Koordinatensystems und der allgemeine Fall mit einer Zerlegung der Eins.

1. Fall Es gebe einen orientierungserhaltenden n -Würfel c in $M \setminus \partial M$ mit $\text{supp } \omega \subset c(\mathbb{I}^n)$. Aufgrund der Rechenregeln für die äußere Ableitung 22.12 und des Fundamentalsatzes im $\mathbb{R}^n$ 22.15 gilt dann

$$\int_c d\omega = \int_{\mathbb{I}^n} c^*(d\omega) = \int_{\mathbb{I}^n} d(c^*\omega) = \int_{\partial \mathbb{I}^n} c^*\omega = \int_{\partial c} \omega.$$

Da nach Annahme $\omega = 0$ auf ∂c , gilt also

$$\int_M d\omega = \int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega = 0.$$

Abb 15 Träger von ω am Rand

Wegen $\text{supp } \omega \subset M \setminus \partial M$ gilt andererseits auch

$$\int_{\partial M} \omega = 0.$$

Also sind beide Integrale gleich, nämlich Null, und die Behauptung ist in diesem Fall bewiesen.

2. Fall Es gebe einen orientierungserhaltenden n -Würfel c in M mit $\text{supp } \omega \subset c(\mathbb{I}^n)$, wobei c genau eine Seite mit ∂M gemeinsam hat. In einem in einer Umgebung von $\mathbb{I}^n$ definierten Koordinatensystem von ∂M sei dies die $(n, 0)$ -Seite. Wir nehmen also an, dass

$$c_{n,0} \subset \partial M,$$

während alle übrigen Seiten keine inneren Punkt mit ∂M gemeinsam haben.

Da c die Orientierung von M erhält, ist

$$\varrho_M = [\partial_1 c, \dots, \partial_n c].$$

Die $(n, 0)$ -Seite von c ist

$$\check{c} := c \circ I_{n,0}^n = c|_{x_n=0}.$$

Somit ist $\partial_k \check{c} = \partial_k c$ für $1 \leq k \leq n-1$. Außerdem weist die äußere Normale von M im Bereich dieses Würfels in die Richtung von $-\partial_n c$, da die Punkte mit $0 \leq x_n \leq 1$ *innerhalb* von M liegen. Also gilt für die Orientierung des Randes

$$\begin{aligned} \varrho_{\partial M} &= [n, \partial_1 \check{c}, \dots, \partial_{n-1} \check{c}] \\ &= -[\partial_n c, \partial_1 c, \dots, \partial_{n-1} c] \\ &= -(-1)^{n-1} [\partial_1 c, \dots, \partial_n c] \\ &= (-1)^n \varrho_M. \end{aligned}$$

Aus den Annahmen folgt, dass $\check{c}$ die einzige Seite von c ist, auf der ω nicht verschwindet. Ferner ist $\check{c}$ ein $n-1$ -Würfel in ∂M , der den Träger von ω

innerhalb von ∂M enthält. Da im Fundamentalsatz im $\mathbb{R}^n$ 22.15 die $(n, 0)$ -Seite von c mit dem Faktor $(-1)^n$ eingeht, folgt hieraus

$$\int_M d\omega = \int_c d\omega = (-1)^n \int_{\partial c} \omega = \int_{c_{n,0}} \omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Also ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen.

3. Fall Betrachte nun den allgemeinen Fall. Wähle dazu eine Zerlegung der Eins $\mathcal{T}$ auf M so, dass für jedes $\tau \in \mathcal{T}$ auf $\tau\omega$ der erste oder zweite Fall zutrifft. Da M kompakt ist, kann diese Zerlegung sogar endlich gewählt werden 21.5. Für die konstante Funktion 1 gilt dann

$$0 = d(1) = d \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \tau = \sum_{\tau \in \mathcal{T}} d\tau,$$

wobei die Summe endlich ist. Also gilt auch

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}} d\tau \wedge \omega = 0.$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \int_M d\omega &= \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_M \tau d\omega \\ &= \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_M (d\tau \wedge \omega + \tau d\omega) \\ &= \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_M d(\tau\omega) \\ &= \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \int_{\partial M} \tau\omega \\ &= \int_{\partial M} \omega. \end{aligned}$$

That's it. >>>>

Bemerkung Der Satz von Stokes ist falsch für *nicht kompakte* Mannigfaltigkeit mit Rand. Denn in diesem Fall ist auch $M \setminus \partial M$ eine Mannigfaltigkeit mit Rand, nur ist der Rand hier die leere Menge. Es ist also in jedem Fall

$$\int_{\partial M} \omega = 0.$$

Es gibt aber $n - 1$ -Formen ω auf M mit

$$\int_M d\omega \neq 0.$$

Auf nicht kompakten Mannigfaltigkeit gilt der Satz vielmehr mit der zusätzlichen Annahme, dass $\text{supp } \omega$ kompakt ist. Der Beweis bleibt derselbe. $\rightarrow$

■ Die Sätze von Gauss und Stokes

Für zwei- und dreidimensionale Mannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^3$ ergibt der Satz von Stokes die klassischen Integralsätze der Vektoranalysis. Dafür definieren wir das *vektorielle Linienelement*

$$d\vec{s} := (dx_1, dx_2, dx_3)^\top$$

und das *vektorielle Flächenelement*

$$d\vec{A} := (dx_2 \wedge dx_3, dx_3 \wedge dx_1, dx_1 \wedge dx_2)^\top.$$

Das *Volumenelement* ist nach wie vor $dV = dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$.

Außerdem erinnern wir an die Definition des Nablaoperators. Sind die Funktion $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ und das Vektorfeld $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ differenzierbar, so heißen

$$\begin{aligned} \nabla f &:= \text{grad } f := (\partial_1 f, \partial_2 f, \partial_3 f)^\top, \\ \nabla \cdot F &:= \text{div } F := \partial_1 F_1 + \partial_2 F_2 + \partial_3 F_3, \\ \nabla \times F &:= \text{rot } F := (\partial_2 F_3 - \partial_3 F_2, \partial_3 F_1 - \partial_1 F_3, \partial_1 F_2 - \partial_2 F_1)^\top \end{aligned}$$

der *Gradient* von f sowie die *Divergenz* und *Rotation* von F .

10 Lemma Für differenzierbares $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ und $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gilt

$$\begin{aligned} df &= \text{grad } f \cdot d\vec{s}, \\ d(F \cdot d\vec{s}) &= \text{rot } F \cdot d\vec{A}, \\ d(F \cdot d\vec{A}) &= \text{div } F \, dV. \end{aligned}$$

Außerdem gilt immer

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla f &= \text{rot grad } f = 0, \\ \nabla \cdot (\nabla \times F) &= \text{div rot } F = 0. \quad \times \end{aligned}$$

⟨⟨⟨ Die erste Identität ist offensichtlich. Die zweite ergibt sich mit

$$\begin{aligned} &d(F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + F_3 dx_3) \\ &= \partial_2 F_1 dx_2 \wedge dx_1 + \partial_3 F_1 dx_3 \wedge dx_1 \\ &\quad + \partial_1 F_2 dx_1 \wedge dx_2 + \partial_3 F_2 dx_3 \wedge dx_2 \\ &\quad + \partial_1 F_3 dx_1 \wedge dx_3 + \partial_2 F_3 dx_2 \wedge dx_3 \\ &= (\partial_2 F_3 - \partial_3 F_2) dx_2 \wedge dx_3 + (\partial_3 F_1 - \partial_1 F_3) dx_3 \wedge dx_1 \\ &\quad + (\partial_1 F_2 - \partial_2 F_1) dx_1 \wedge dx_2. \end{aligned}$$

Und die dritte folgt mit

$$\begin{aligned}
& d(F_1 dx_2 \wedge dx_3 + F_2 dx_3 \wedge dx_1 + F_3 dx_1 \wedge dx_2) \\
&= \partial_1 F_1 dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 + \text{zyklische Vertauschungen} \\
&= (\partial_1 F_1 + \partial_2 F_2 + \partial_3 F_3) dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3.
\end{aligned}$$

Mit diesen Identitäten und $d \circ d = 0$ folgt schließlich

$$\begin{aligned}
0 &= d^2 f &&= d(\text{grad } f \bullet d\vec{s}) = \text{rot grad } f \bullet d\vec{A}, \\
0 &= d^2(F \bullet d\vec{s}) = d(\text{rot } F \bullet d\vec{A}) = \text{div rot } F \bullet dV. \quad \gggg
\end{aligned}$$

Damit erhalten wir die folgenden Sätze der Vektoranalysis. Der Satz von Gauss wird auch *Divergenzsatz* genannt.

- 11 **Satz von Gauss** Sei M^3 eine kompakte orientierte 3-Mannigfaltigkeit mit Rand. Ist das Vektorfeld F in einer Umgebung von M^3 differenzierbar, so gilt

$$\int_{\partial M^3} F \bullet d\vec{A} = \int_{M^3} d(F \bullet d\vec{A}) = \int_{M^3} \text{div } F \, dV. \quad \times$$

- 12 **Satz von Stokes** Sei M^2 eine kompakte orientierte 2-Mannigfaltigkeit mit Rand. Ist das Vektorfeld F in einer Umgebung von M^2 differenzierbar, so gilt

$$\int_{\partial M^2} F \bullet d\vec{s} = \int_{M^2} d(F \bullet d\vec{s}) = \int_{M^2} \text{rot } F \bullet d\vec{A}. \quad \times$$

Der Fundamentalsatz für Wegintegrale gehört ebenfalls dazu.

- 13 **Satz von Fund** Sei M^1 eine kompakte orientierte 1-Mannigfaltigkeit mit Rand. Ist die Funktion f in einer Umgebung von M^1 differenzierbar, so gilt

$$\int_{\partial M^1} f = \int_{M^1} df = \int_{M^1} \text{grad } f \bullet d\vec{s}. \quad \times$$

23.4

Das Volumenelement

Um die Integralsätze in der klassischen Form zu notieren, benötigen wir noch das skalare Linien-, Flächen- und Volumenelement. Zunächst der Standardraum.

- 14 **Lemma** Im euklidischen n -Raum gibt es genau eine alternierende n -Form ω , das *Volumenelement*, so dass

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = 1$$

für jede positiv orientierte Orthonormalbasis $v_1, \dots, v_n$. $\times$

⟨⟨⟨ Ist $\nu_1, \dots, \nu_n$ irgendeine positiv orientierte Orthonormalbasis, so gibt es genau eine n -Form ω mit $\omega(\nu_1, \dots, \nu_n) = 1$, denn $\Lambda^n \mathbb{R}^n$ ist eindimensional. Ist $w_1, \dots, w_n$ eine weitere positiv orientierte Orthonormalbasis, so ist der Basiswechsel T mit $T\nu_\mu = w_\mu$ für $1 \leq \mu \leq n$ eine orientierungserhaltende, *orthogonale* Transformation. Also ist

$$\det T = 1,$$

und deshalb _{22.6}

$$\begin{aligned} \omega(w_1, \dots, w_n) &= \omega(T_*\nu_1, \dots, T_*\nu_n) \\ &= T^*\omega(\nu_1, \dots, \nu_n) \\ &= (\det T) \omega(\nu_1, \dots, \nu_n) = 1. \end{aligned}$$

Also gibt es nur eine solche Form ω . ⟩⟩⟩

Ist M eine orientierte n -Mannigfaltigkeit, so ist jeder Tangentialraum ein orientierter n -dimensionaler Untervektorraum des Umgebungsraumes. Somit existiert in jedem Punkt p ein eindeutiges Volumenelement $\omega(p)$. Es ist nicht schwer zu zeigen, dass dies eine *differenzierbare* n -Form auf M definiert.

Definition Die auf diese Weise auf einer orientierten Mannigfaltigkeit M definierte n -Form heißt das *Volumenelement* auf M und wird mit dV bezeichnet. Die reelle Zahl

$$|M| := \int_M dV$$

heißt das *Volumen* von M . $\times$

Bemerkung Die Bezeichnung dV bedeutet *nicht*, dass es sich um das Differential einer Funktion handelt. Es ist nur eine historisch bedingte Schreibweise. $\rightarrow$

▶ Auf einer n -Mannigfaltigkeit M im $\mathbb{R}^n$, also einem Gebiet im $\mathbb{R}^n$, ist

$$dV = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

und

$$|M| = \int_M dV = \int_M 1$$

das klassische Volumen von M , wenn dieses Integral existiert. $\leftarrow$

Im eindimensionalen Fall spricht man natürlich vom *Längen-* oder *Linienelement* ds , im zweidimensionalen Fall vom *Flächenelement* dA , und reserviert dV für das dreidimensionale Volumenelement. Diese haben eine einfache geometrische Interpretation, wenn wir vom Standardskalarprodukt ausgehen.

- 15 **Lemma** Sind u, v, w positiv orientierte Tangentialvektoren an eine orientierte 1-, 2- respektive 3-Mannigfaltigkeit, so ist

- (i) $ds(u)$ die Länge des Vektors u ,
(ii) $dA(u, v)$ der Flächeninhalt des Parallelogramms mit Seiten u, v ,
(iii) $dV(u, v, w)$ das Volumen des Spates mit Seiten u, v, w . $\times$

⟨⟨⟨ Wir zeigen (ii). Wir wählen in T_pM eine Orthonormalbasis w_1, w_2 so, dass $u = \lambda w_1$ mit $\lambda > 0$ und $v = \mu w_2 + \nu w_1$. Dann ist $\mu > 0$, da u und v positiv orientiert sind, und

$$dV(u, v) = dV(\lambda w_1, \mu w_2) = \lambda \mu dV(w_1, w_2) = \lambda \mu.$$

Dies ist gerade der Flächeninhalt des Parallelogramms mit den Seiten u und v . $\rangle\rangle\rangle$

Wir beschreiben das Linien- und das Flächenelement noch etwas genauer.

- 16 **Satz** Sei M eine orientierte 1-Mannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^n$. Mit dem Tangenteneinheitsvektor T an M gilt dann

$$ds = T_1 dx_1 + \dots + T_n dx_n$$

sowie auf TM

$$T_\nu ds = dx_\nu, \quad 1 \leq \nu \leq n. \quad \times$$

⟨⟨⟨ Ist $\nu \in T_pM$ positiv orientiert, so ist $T = \nu / \|\nu\|$ und $_{15}$

$$ds(\nu) = \|\nu\| = \langle T, \nu \rangle = (T_1 dx_1 + \dots + T_n dx_n)(\nu).$$

Dies ergibt die erste Identität. Die zweite Identität muss nur für den Vektor T verifiziert werden, da er in jedem Punkt den Tangentialraum aufspannt. Mit $ds(T) = 1$ ergibt sich dies aus

$$T_\nu ds(T) = T_\nu = dx_\nu(T). \quad \rangle\rangle\rangle$$

■ Das Flächenelement

Sei M eine orientierte 2-Mannigfaltigkeiten im $\mathbb{R}^3$. Auch wenn diese nicht als Rand einer 3-Mannigfaltigkeit auftreten, können wir ihnen ihr eindeutige ›äußere‹ Normale wie folgt zuordnen.

Seien $\nu, w \in T_pM$ positiv orientiert. Dann steht der Vektor $\nu \times w$ senkrecht auf T_pM , und n sei derjenige Einheitsvektor in dieser Richtung mit

$$[n, \nu, w] = [e_1, e_2, e_3].$$

In diesem Fall bilden n, ν, w ein *rechtshändiges Dreibein*: die Vektoren n, ν, w weisen, in dieser Reihenfolge, in dieselben Richtungen wie die ausgestreckten

Abb 16
Zum Flächenelement

Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand. Es ist nicht schwer zu verifizieren, dass diese ›äußere‹ Normale wohldefiniert ist und differenzierbar vom Punkt p abhängt $A-2$.

Bemerkung Es gilt auch die Umkehrung. Können wir auf einer Hyperfläche M im $\mathbb{R}^3$ eine differenzierbare Normalenfunktion $n: M \rightarrow \mathbb{S}^2$ erklären, so ist M orientierbar $A-3$. Die Nichtorientierbarkeit des Möbiusbandes ist daher gleichbedeutend mit der Unmöglichkeit, dort eine stetige Normalenfunktion zu definieren — denn beide Seiten des Bandes gehören zur selben Fläche. $\rightarrow$

- 17 **Satz** Sei M eine orientierte 2-Mannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^3$. Mit der nach außen gerichteten Einheitsnormalen n an M gilt

$$dA = n_1 dx_2 \wedge dx_3 + n_2 dx_3 \wedge dx_1 + n_3 dx_1 \wedge dx_2.$$

Ferner gelten auf TM die Identitäten

$$n_1 dA = dx_2 \wedge dx_3, \quad n_2 dA = dx_3 \wedge dx_1, \quad n_3 dA = dx_1 \wedge dx_2. \quad \times$$

⟨⟨⟨ Sind $v, w \in T_p M$ positiv orientiert, so ist 15

$$dA(v, w) = \|v \times w\|,$$

denn die Länge des Kreuzproduktvektors repräsentiert den Inhalt des von v, w aufgespannten Parallelogramms. Aufgrund der Definition von n gilt außerdem

$$v \times w = n \|v \times w\|.$$

Also ist

$$\begin{aligned} dA(v, w) &= \langle n, v \times w \rangle = \begin{vmatrix} n_1 & v_1 & w_1 \\ n_2 & v_2 & w_2 \\ n_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ &= (n_1 dx_2 \wedge dx_3 + n_2 dx_3 \wedge dx_1 + n_3 dx_1 \wedge dx_2)(v, w). \end{aligned}$$

Dies ist die erste Identität. Außerdem folgt für einen Vektor $u \in \mathbb{R}^3$

$$\langle u, v \times w \rangle = \langle u, n \rangle \|v \times w\| = \langle u, n \rangle dA(v, w).$$

Wählen wir für u die Basisvektoren e_1, e_2, e_3 , so erhalten wir

$$(dx_2 \wedge dx_3)(v, w) = n_1 dA(v, w)$$

sowie die entsprechenden zyklischen Vertauschungen hiervon, also die zweiten Gleichungen. $\gggg$

Bemerkung Die zweiten Gleichungen in diesem Satz gelten nur auf TM , also bei Anwendung auf Tangentialvektoren an M . Im Gesamtraum $\mathbb{R}^3$ gelten sie im Allgemeinen *nicht*. Entsprechendes gilt auch für das Linienelement. $\rightarrow$

23.5

Die klassischen Sätze

Wir stellen die Sätze von Gauss und Stokes jetzt mit den skalaren Linien- und Flächenelementen dar. Die Verbindung zu den vektoriellen Elementen stellt das folgende Lemma her.

18 Lemma Sei $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein differenzierbares Vektorfeld. Dann gilt

$$F \bullet d\vec{s} = \langle F, T \rangle ds, \quad F \bullet d\vec{A} = \langle F, n \rangle dA$$

auf einer Kurve mit positiv orientiertem Tangenteneinheitsvektor T respektive einer Fläche mit positiv orientierter Normalen n . $\times$

$\llll$ Auf dem Tangentialraum einer Kurve ist ${}_{16} T_v ds = dx_v$ und deshalb

$$F \bullet d\vec{s} = F_1 T_1 ds + F_2 T_2 ds + F_3 T_3 ds = \langle F, T \rangle ds.$$

Auf dem Tangentialraum einer Fläche ist ${}_{17} dx_2 \wedge dx_3 = n_1 dA$ etc und damit

$$F \bullet d\vec{A} = F_1 n_1 dA + F_2 n_2 dA + F_3 n_3 dA = \langle F, n \rangle dA. \quad \gggg$$

Damit erhalten die Integralsätze die folgende Formulierung.

19 Satz von Gauss Sei M^3 eine kompakte orientierte 3-Mannigfaltigkeit mit Rand. Ist das Vektorfeld F in einer Umgebung von M^3 differenzierbar, so gilt

$$\int_{\partial M^3} \langle F, n \rangle dA = \int_{M^3} \nabla \bullet F dV,$$

wobei n die äußere Normale an M^3 bezeichnet. $\times$

$\llll$ Denn $\langle F, n \rangle dA = F \bullet d\vec{A}$ und

$$d(F \bullet d\vec{A}) = \operatorname{div} F dV = \nabla \bullet F dV. \quad \gggg$$

- 20 **Satz von Stokes** Sei M^2 eine kompakte orientierte 2-Mannigfaltigkeit mit Rand. Ist das Vektorfeld F in einer Umgebung von M^2 differenzierbar, so gilt

$$\int_{\partial M^2} \langle F, T \rangle ds = \int_{M^2} \langle \nabla \times F, n \rangle dA,$$

wobei n die äußere Normale an M^2 und T den Tangenteneinheitsvektor an ∂M^2 bezeichnet, die durch die Orientierung von M^2 bestimmt sind. $\times$

««« Denn $\langle F, T \rangle ds = F \cdot d\vec{s}$ und

$$d(F \cdot d\vec{s}) = \text{rot } F d\vec{A} = \langle \nabla \times F, n \rangle dA. \quad \text{»»»}$$

■ Die Formeln von Green

Ist das Vektorfeld F der Gradient einer Funktion f , so ist im Satz von Gauß das Volumenintegral über $\text{div grad } f$ zu bilden, was wegen

$$\nabla \cdot \nabla = \partial_1^2 + \partial_2^2 + \partial_3^2 =: \Delta$$

nichts anderes ist als die Anwendung des *Laplaceoperators* Δ auf f , also

$$\Delta f = \partial_1^2 f + \partial_2^2 f + \partial_3^2 f.$$

- 21 **Korollar** Ist die Funktion f in einer Umgebung von M^3 differenzierbar, so gilt

$$\int_{M^3} \Delta f dV = \int_{\partial M^3} \langle \nabla f, n \rangle dA. \quad \times$$

Das Skalarprodukt im Oberflächenintegral ist die Richtungsableitung von f in Richtung der äußeren Normalen an M^3 . Diese heißt die *Normalenableitung* von f und wird auch notiert als

$$\frac{\partial f}{\partial n} := \langle \nabla f, n \rangle.$$

Daher schreibt man die letzte Formel auch

$$\int_{M^3} \Delta f dV = \int_{\partial M^3} \frac{\partial f}{\partial n} dA.$$

Wenden wir den Satz von Gauss auf ein Vektorfeld $F = g \nabla f$ an, so wird mit der gewöhnlichen Produktregel

$$\text{div } F = \nabla \cdot (g \nabla f) = \nabla g \cdot \nabla f + g \Delta f.$$

Das Ergebnis ist dann die *Greensche Formel*

$$\int_{M^3} (\nabla g \cdot \nabla f + g \Delta f) dV = \int_{\partial M^3} g \langle \nabla f, n \rangle dA.$$

Vertauschen wir g und f und bilden die Differenz, so fällt der Term $\nabla g \cdot \nabla f$ heraus, und wir erhalten folgendes Ergebnis.

- 22 **Greensche Formel** Sei M^3 eine kompakte orientierte 3-Mannigfaltigkeit mit Rand. Sind f und g in einer Umgebung von M^3 differenzierbar, so gilt

$$\begin{aligned} \int_{M^3} (f \Delta g - g \Delta f) \, dV &= \int_{\partial M^3} \langle f \nabla g - g \nabla f, n \rangle \, dA \\ &= \int_{\partial M^3} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) \, dA. \quad \times \end{aligned}$$

■ **Koordinatendarstellung**

Wir stellen das Flächenelement noch in lokalen Koordinaten dar. Wir erhalten damit die Flächenintegrale in klassischer Form.

- 23 **Satz** In einem orientierungstreuen Koordinatensystem $\varphi: (u, \nu) \mapsto \varphi(u, \nu)$ einer orientierten 2-Mannigfaltigkeit M^2 im $\mathbb{R}^3$ ist

$$n = \frac{\varphi_u \times \varphi_\nu}{\|\varphi_u \times \varphi_\nu\|}$$

und

$$\varphi^* dA = \|\varphi_u \times \varphi_\nu\| \, du \wedge d\nu = \sqrt{EG - F^2} \, du \wedge d\nu$$

mit $E = \langle \varphi_u, \varphi_u \rangle$, $G = \langle \varphi_\nu, \varphi_\nu \rangle$, $F = \langle \varphi_u, \varphi_\nu \rangle$. $\times$

⟨⟨⟨ Es ist $\varphi^* dA = f(u, \nu) \, du \wedge d\nu$ mit $_{15}$

$$f(u, \nu) = \varphi^* dA(e_1, e_2) = dA(\varphi_u, \varphi_\nu) = \|\varphi_u \times \varphi_\nu\|.$$

Die letzte Darstellung folgt hieraus mit $\|\nu \times w\|^2 = \|\nu\|^2 \|w\|^2 - \langle \nu, w \rangle^2$. $\rangle\rangle\rangle$

- 24 **Korollar** Der Flächeninhalt einer Fläche M mit Koordinaten $\varphi: D \rightarrow M$ ist

$$|M| = \int_D \|\varphi_u \times \varphi_\nu\| \, d\lambda,$$

und das Integral einer skalaren Funktion $\psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ über M gegeben durch

$$\int_M \psi \, dA = \int_D \psi(\varphi(u, \nu)) \|\varphi_u \times \varphi_\nu\| \, d\lambda. \quad \times$$

► **Funktionsgraph** Der Graph einer differenzierbaren Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit im $\mathbb{R}^3$ und wird beschrieben durch ein einziges Koordinatensystem

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (u, \nu) \mapsto (u, \nu, f(u, \nu))^T.$$

Also ist

$$\varphi_u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_u \end{pmatrix}, \quad \varphi_\nu = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_\nu \end{pmatrix}, \quad \varphi_u \times \varphi_\nu = \begin{pmatrix} -f_u \\ -f_\nu \\ 1 \end{pmatrix},$$

und damit

$$\|\varphi_u \times \varphi_v\|^2 = 1 + f_u^2 + f_v^2.$$

Der Flächeninhalt des Graphen Γ von f über einem Gebiet D ist demnach

$$|\Gamma| = \int_{\Gamma} dA = \int_D \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} d\lambda.$$

Entsprechendes gilt für das Integral einer skalaren Funktion ψ über Γ . ◀

► **Rotationsfläche** Sei $f: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$ differenzierbar. Durch Rotation des Graphen von f um die x -Achse entsteht eine Rotationsfläche R , die durch

$$\varphi: [a, b] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (t, \theta) \mapsto (t, f(t) \cos \theta, f(t) \sin \theta)^\top$$

parametrisiert wird. Es ist

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} 1 \\ f'(t) \cos \theta \\ f'(t) \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \varphi_\theta = \begin{pmatrix} 0 \\ -f(t) \sin \theta \\ f(t) \cos \theta \end{pmatrix},$$

und damit

$$E = \|\varphi_t\|^2 = 1 + (f')^2, \quad G = \|\varphi_\theta\|^2 = f^2, \quad F = \langle \varphi_t, \varphi_\theta \rangle = 0.$$

Wegen $f \geq 0$ ist also

$$\varphi^* dA = f \sqrt{1 + (f')^2} dt \wedge d\theta.$$

Der Flächeninhalt der Rotationsfläche ist demnach

$$|R| = \int_R dA = 2\pi \int_a^b f(t) \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt.$$

Typischerweise sind solche Integrale nicht mehr elementar auswertbar. ◀

Zum Vergleich notieren wir noch das entsprechende Ergebnis für Kurven.

25 **Satz** In einem Koordinatensystem φ einer orientierten 1-Mannigfaltigkeit M ist

$$T = \frac{\dot{\varphi}}{\|\dot{\varphi}\|}, \quad \varphi^* ds = \|\dot{\varphi}(t)\| dt.$$

Die Länge der Mannigfaltigkeit M mit Koordinaten $\varphi: I \rightarrow M$ ist demnach

$$|M| = \int_M ds = \int_I \|\dot{\varphi}(t)\| dt,$$

und das Integral einer skalaren Funktion ψ entlang M ist

$$\int_M \psi ds = \int_I \psi(\varphi(t)) \|\dot{\varphi}(t)\| dt. \quad \times$$

Bemerkungen a. Die Länge L einer stetigen Kurve $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ hatten wir als das Supremum der Längen aller einbeschriebenen Polygonzüge definiert, falls dieses Supremum endlich ist. Ist die Kurve stetig differenzierbar, so ist diese Länge durch das Integral über ds gegeben.

b. Für *Flächen* gilt dies nicht mehr! Man kann den Inhalt einer Fläche nicht mehr dadurch definieren, das man diese durch hinreichend kleine Polygone approximiert und das Supremum über deren Flächensumme bildet. Dieses Supremum kann unendlich sein, auch wenn das Integral über das Flächenelement endlich ist A-13. $\rightarrow$

■ Physikalischer Hintergrund

Die Begriffe Divergenz und Rotation sowie die klassischen Sätze der Vektoranalysis haben ihren Ursprung in der Strömungslehre.

Das Vektorfeld $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ beschreibe die *stationäre* Strömung einer Flüssigkeit. Das heißt, die Strömungslinien ändern sich *nicht* im Laufe der Zeit. Die Aufgabe ist, die Strömungsbilanz bezüglich eines fiktiven Volumens K innerhalb der Strömung zu bestimmen.

In einem beliebigen Koordinatensystem der Oberfläche von K ist das infinitesimale Strömungsvolumen gegeben durch das Volumen desjenigen Spates, das durch den Strömungsvektor F und den zwei Tangentialvektoren ν und w des Koordinatensystems aufgespannt wird. Dieses Volumen ist gegeben durch

$$F \cdot (\nu \times w) = F \cdot d\vec{A}(\nu, w).$$

Der Beitrag einer nach außen gerichteten Strömung wird hierbei positiv gewertet, einer nach innen gerichteten Strömung negativ. Die gesamte Bilanz ist das Integral dieser Größe über den Rand ∂K des Volumens. Gemäß dem Satz von Gauss gilt hierfür

$$\int_{\partial K} F \cdot d\vec{A} = \int_K \operatorname{div} F \, dV.$$

Dies gilt für jedes fiktive Volumen K innerhalb der Strömung.

Betrachten wir nun Kugeln $B_r(x)$ um einen festen Punkt x mit immer kleineren Radien, so erhalten wir

$$\begin{aligned} (\operatorname{div} F)(x) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} \operatorname{div} F \, dV \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{\partial B_r(x)} F \cdot d\vec{A}. \end{aligned}$$

Somit beschreibt $\operatorname{div} F$ in jedem Punkt die *infinitesimale Strömungsbilanz* oder *Quelldichte* des Vektorfeldes F . Verschwindet die Divergenz überall, so heißt die Strömung *inkompressibel*.

- 26 **Notiz** Ein auf einem sternförmigen Gebiet inkompressibles Vektorfeld F besitzt ein **Vektorpotential** V . Das heißt, es gilt

$$F = \operatorname{rot} V. \quad \times$$

⟨⟨⟨ Mit $\operatorname{div} F = 0$ ist $d(F \cdot d\vec{A}) = 0$. Aufgrund des Lemmas von Poincaré^{22.13} ist also $F \cdot d\vec{A}$ exakt, also

$$F \cdot d\vec{A} = d(V \cdot d\vec{s}) = \operatorname{rot} V \cdot d\vec{A}$$

mit einem gewissen Vektorfeld V . Also ist $F = \operatorname{rot} V$. ⟩⟩⟩

Betrachte nun eine fiktive Membran M mit Rand ∂M innerhalb der Strömung. Das Integral

$$\int_{\partial M} F \cdot d\vec{s} = \int_{\partial M} \langle F, T \rangle ds$$

können wir als Bilanz des Winkels des Strömungsvektors F mit der Tangentialrichtung T über den gesamten Rand ∂M interpretieren. Es stellt somit ein Maß der Zirkulation des Vektorfeldes entlang ∂M dar. Mit dem Satz von Stokes gilt nun

$$\int_{\partial M} F \cdot d\vec{s} = \int_M \operatorname{rot} F \cdot d\vec{A}.$$

Somit können wir $\operatorname{rot} F$ interpretieren als das Maß für die infinitesimale Verwirbelung eines Vektorfeldes. Verschwindet die Rotation überall, so heißt die Strömung **wirbelfrei**.

- 27 **Notiz** Ein auf einem sternförmigen Gebiet wirbelfreies Vektorfeld F ist ein **Gradientenfeld**. Das heißt, es existiert eine Funktion f , so dass

$$F = \nabla f. \quad \times$$

⟨⟨⟨ Mit $\operatorname{rot} F = 0$ ist auch $\operatorname{rot} F \cdot d\vec{A} = 0$ und damit $d(F \cdot d\vec{s}) = 0$. Also ist mit dem einfachen Lemma von Poincaré^{18.14}

$$F \cdot d\vec{s} = df = \nabla f \cdot d\vec{s}$$

mit einer skalaren Funktion f . Also ist $F = \nabla f$. ⟩⟩⟩

23.6 Zwei Anwendungen

Als erste Anwendung zeigen wir die Mittelwerteigenschaft harmonischer Funktionen im $\mathbb{R}^3$.

28 **Satz** Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und harmonisch. Dann gilt

$$f(p) = \frac{1}{|\partial B_r(p)|} \int_{\partial B_r(p)} f \, dA$$

für jede Kugel $B_r(p)$, die im Definitionsbereich von f enthalten ist. $\times$

««« Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $p = 0$. Definiere φ_t durch

$$\varphi_t(x) := f(tx)$$

für alle $t \geq 0$ und $x \in \mathbb{R}^3$, für die tx im Definitionsbereich von f liegt. Betrachte

$$I_t = \int_{\partial B_r(0)} \varphi_t \, dA.$$

Dann ist $\varphi_0 \equiv f(0)$ und $I_0 = |B_r(0)|$. Es genügt daher zu zeigen, dass I_t konstant in t ist. Nun ist

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} I_t &= \int_{\partial B_r(0)} \frac{d}{dt} \varphi_t \, dA \\ &= \int_{\partial B_r(0)} \nabla f(tx) \cdot x \, dA = r \int_{\partial B_r(0)} \nabla f(tx) \cdot n \, dA, \end{aligned}$$

denn im Punkt $x \in \partial B_r(0)$ ist die äußere Normale $n = x/r$. Mit Gauss folgt

$$\frac{d}{dt} I_t = r t \int_{B_r(0)} \Delta f(tx) \, dV = 0,$$

da ja $\Delta f = 0$ nach Voraussetzung. $\gggg$

Zum Abschluss beweisen wir noch den folgenden

29 **Satz des Archimedes** Die Auftriebskraft eines in einer homogenen Flüssigkeit befindlichen Körpers ist gleich dem Gewicht des von diesem Körper verdrängten Volumens. $\times$

««« Die Flüssigkeit fülle das Gebiet $\mathbb{M} = \{z \leq 0\}$ aus und habe die homogene Dichte 1. Der an einem Punkt in der Tiefe z ausgeübte Druck entspricht der Höhe der Flüssigkeitssäule über dem Punkt und ist nach unten gerichtet. Wegen $z < 0$ ist er also

$$P = z e_z.$$

Sei nun M eine berandete 3-Mannigfaltigkeit in $\mathbb{M}$. Der auf einen Randpunkt p von M wirkende Druck ist die in Normalenrichtung wirkende Komponente des Druckvektors

$$P_n = \langle P, n \rangle n.$$

Diese ist mit dem Flächenelement dA zu multiplizieren und über den gesamten Rand von M zu integrieren. Die Auftriebskraft ist demnach

$$F = \int_{\partial M} \langle P, n \rangle dA.$$

Darauf können wir den Divergenzatz anwenden. Wegen $\operatorname{div} P = 1$ erhalten wir

$$F = \int_{\partial M} \langle P, n \rangle dA = \int_M \operatorname{div} P dV = \int_M dV = |M|.$$

Da wir die Dichte der Flüssigkeit auf 1 normalisiert hatten, entspricht der letzte Wert dem Gewicht der von M verdrängten Flüssigkeit. $\gggg$

Abb 17 Zum Satz des Archimedes